

MILAN HERAK, LUKA BOJANIĆ, IVAN GUŠIĆ i VLADIMIR CUKOR

## PALEONTOLOŠKA DOKUMENTACIJA JURE U PODRUČJU RIJEKE KORANE IZMEĐU BARILOVIĆA I SLUNJA

### S 1 slikom u prilogu

Prikupljena je nova paleontološka dokumentacija za naslage lijas i malma što je omogućilo preciznije odvajanje jure od krede. Na osnovu superpozicije potvrđena je ranija pretpostavka o kontinuitetu karbonatne sedimentacije u juri.

Jurske naslage područja Korane zastupane su isključivo vavnencima i dolomitima koje je na osnovu litoloških karakteristika nemoguće odvojiti od krede. Žato je u starijim radovima češće dolazilo do zamjene jurskih i kređnih sedimenta (F. Koch 1934 i M. Herak 1956). Kako je u posljednje vrijeme poznavanje jurskih mikrofosila znatno uznapredovalo, pristupilo se prikupljanju uzoraka u svrhu dokumentacije pojedinih stratigrafskih nivoa unutar jure i postavljanja preciznije granice između jure i donje krede. U tom zadatku sudjelovali su još i S. Božićević i S. Bahun pa im se i ovom prilikom zahvaljujemo na pomoći.

Nova dokumentacija potvrdila je ranije mišljenje (M. Herak 1956) o postojanju kontinuiranog profila jure od Korane do Skradske gore kao i u području Barilovića. Međutim, novi su dokumenti pokazali da su jurske naslage rasprostranjenije nego se prije prepostavljalo i to na račun krede. Prikazat ćemo ukratko slijed jurskih naslaga s paleontološkom dokumentacijom po pojedinim nalazištima.

### Lijas

Donja je jura zastupana dolomitima i vavnencima sive i sivosmeđe boje. Paleontološki su dokumenti nađeni na lijevoj dolinskoj strani Korane malo užvodno uz Barilovića a sastoje se od brojnih školjkaša iz skupine *Lithiotidae* (sl. 1, nalazište 4). Jaka tektonска poremećenost one-moguće precizniju razdiobu unutar lijas-a. Slično je i s naslagama kod Čulca, Siće i Cerovca. Kod Čulca je utvrđena *Orbitopsella praecursor* (Gümbel) koja dokazuje srednji lijas (nal. 9) i *Lituosepta recoarensis* Gatti (nal. 10).

U području Lučica i Končalovića lijas se nastavlja kontinuirano na dolomite gornjega trijasa a sastoje se od kristaliničnih dolomita i sivih vavnencaca. Donji je lijas pretežno dolomitičan, a u srednjem više dolaze do izražaja vavnenci s ostacima školjkaša iz skupine *Lithiotidae* (nal.

11). Osim njih nađeni su i mikrofosili i to *Orbitopsella precursor* (G ü m b e l) i *Palaeodasycladus mediterraneus* (P i a) – (nal. 12). Gornji je lijas ponovno pretežno dolomitičan s nešto mrljastih vapnenaca.

### D o g e r

Za doger u istraživanom području nemamo sigurne paleontološke dokumentacije, osim nekih mikrofosa čije pojavljivanje počinje u gornjem dogeru ali se nastavlja bilo u donji, bilo kroz čitav malm. Zato na njegovo postojanje zaključujemo uglavnom na osnovu superpozicije, osobito u području Skradske gore gdje postoji kontinuirani profil s dokazanim malmom i lijasom. Naslage koje su izdvojene kao doger pojavljuju se u dva facijesa, kao dobro uslojeni sivi vapnenci i kao vapnenci u izmjeni s dolomitima. Čisti su vapnenci osobito lijepo razvijeni istočno od Lučica i Končalovića, zatim ih ima kod Barilovića i drugdje. Vapnenci u izmjeni s kristaliničnim dolomitima razvijeni su u području Livade – Pjevići – Kurjevac – Ilići (istočno od Primišlja). Tu nalazimo pretežno sive uslojene vapnence koji se vertikalno i bočno izmjenjuju sa smedesivim i sivim dolomitima. Ipak dolomiti imaju podređeno značenje.

### M a l m

Najpotpunija dokumentacija prikupljena je u području malmskih naslaga koje nalazimo na širokom prostranstvu. Ima ih u području Cerovac – Žabljak – Resnica na lijevoj obali Korani, zatim u području Karamarkovići – Kozlinac – Kosirsko selo – Donji Skrad – Skradska gora – Kovačevići na desnoj obali Korane. U njih je usječena i dolina Korane uzvodno od Lučica; nadalje ih ima u području Savića, Raića i drugdje. U većem dijelu terena prevladavaju svjetlosivi vapnenci s nešto dolomita. Međutim u uzvodnijem dijelu terena mjestimično prevladavaju dolomiti s nešto vapnenaca. Da bi se omogućilo kasnije ulaženje i u detaljniju razdiobu ovih naslaga navest ćemo redom sve lokalitete mikro- i makrofosa s najvažnijim određenim oblicima:

#### Nalazišta:

- a) Područje Barilović – Skradska gora

Nalazišta su navedena uglavnom od sjevera prema jugu.

Zapadno od Leskovca, pa prema jugu do Korane (nal. 1, 2 i 3): *Ellipsactinia* sp. indet.

Neposredno uzvodno (južno) od Barilovića, na desnoj obali Korane: *Cladocoropsis mirabilis Felix* (nal. 5) i hetetidi, vjerojatno vrsta *Bauneia multitabulata* (D e n i n g e r) – (nal. 6).

Na jugoistočnim padinama brda Glavica (265 m): *Ellipsactinia* sp. indet. (nal. 7), a nešto južnije kod sela Burdeli (nal. 8): *Clypeina jurassica Favre* i krupni tintinidi.

Sjeverno od Skradske gore (nal. 13): *Cladocoropsis mirabilis Felix*, te na samom hrptu Skradske gore (nal. 14): *Clypeina jurassica Favre* zajedno s krupnim tintinidima.

b) Područje Slunj – Primišlje (također generalno od sjevera prema jugu):

Istočno od brda Kurjevac (nal. 15): *Macroporella sellii Crescenti*.

Kod sela Pjevići (nal. 16): *Kurnubia palastiniensis Henson* i *K. wellingsi* (Henson), te *Pfenderina cf. salernitana Sartoni & Crescenti* (nal. 17), što ukazuje eventualno i na više dijelove dogera.

Kod sela Šaše, blizu ceste Slunj – Primišlje (nal. 18): *Kurnubia palastiniensis Henson*, a nešto istočnije (nal. 19): *Salpingoporella annulata Carozzi* i *Clypeina jurassica Favre*, što je u skladu sa činjenicom da u tom području idući prema istoku nalazimo sve mlađe naslage u kontinuiranom profilu jure.

S jugozapadne strane ceste Slunj – Primišlje, na istočnim padinama brda Cerovita glava (366 m) – (nal. 20): *Clypeina jurassica Favre*. Isti fosil nađen je i nešto jugoistočnije uz istu cestu kod sela Kukići (nal. 21) zajedno s krupnim tintinidima.

U području uz tok Korane sjeverozapadno od Zeče varoši nalazi fosila, osobito klipeina, dosta su mnogobrojni i česti: nal. 22: *Kurnubia palastiniensis Henson*, nal. 23: *Macroporella sellii Crescenti*, nal. 24–27: *Clypeina jurassica Favre*, nal. 28: *Macroporella sellii Crescenti*, *Pfenderina trochoidea Smout & Sugden*.

S istočne strane autoceste Slunj–Karlovac također je na dva mjesta dokazan malrn; i to:

Nal. 29 uz cestu kod G. Nikšića: *Kurnubia palastiniensis Henson*, i

Nal. 30, nešto sjeveroistočnije od prethodnog, kod sela Rendulići: *Kurnubia* sp. indet.

Jugozapadno od Slunja, a istočno od brda Plieš (418 m) na zapadnoj obali Slunjčice nađeni su *Cladocoropsis mirabilis Felix* (nal. 31) i *Clypeina jurassica Favre* (nal. 32), što se dobro podudara sa superpozicijskim položajem naslaga u tom području.

Osim naveđenih nalaza u područjima prikazanim na skicama, postoji i jedan zasad a izoliran nalaz malmskih mikrofosila (*Kurnubia palastiniensis Henson*, *Labyrinthina mirabilis Weynschenk*, *Protopeneroplis striata Weynschenk*, *Pfenderina salernitana Sartoni & Crescenti*) u području inače izgrađenom od donjakrednih naslaga kod sela Mavrović na lijevoj obali Korane, kao i u klinu malmskih naslaga na desnoj obali Korane južno od Veljuna sa sličnom mikrofilsnom zajednicom.

Primljeno 27. 9. 1965.

Geološko-paleontološki zavod,  
Sveučilište Zagreb,  
Socijalističke revolucije 8  
Institut za geološka istraživanja  
Zagreb, Kupska 2

## LITERATURA

- Herak, M. 1956: O mezozoiku područja Korane između Barilovića i Poloja. Geol. vjesnik 8-9 (za god. 1954-55), pp. 53-66. Zagreb.
- Koch, F. 1934: Geološka karta Karlovac-Vojnić M 1:75.000. Geol. inst. kralj. Jugosl. Beograd.

M. HERAK, L. BOJANIĆ, I. GUŠIĆ und V. CUKOR

### PALÄONTOLOGISCHE DOKUMENTATION DER JURAABLÄGERUNGEN IM GEBIET DES FLUSSES KORANA ZWISCHEN BARILOVIĆ UND SLUNJ

Neue paläontologische Funde im untersuchten Gebiet haben die Annahme (M. Herak 1956) bestätigt, dass die Jura-Ablagerungen eine geschlossene Serie von Kalken und Dolomiten darstellen und dass alle drei Abteilungen vertreten sind.

Der Lias wird durch *Lithiotiden*, *Orbitopsella precursor* (Gümbel), *Palaeodasy-cladus mediterraneus* (Pia) u. a. bewiesen (siehe die Fundorte 4, 9, 10, 11 und 12 auf der Abb im kroat. Text).

Der Dogger hat bisher keine sicheren Leitfossilien geliefert. Aber dass er vorhanden ist, zeigt die Superposition der Schichten, wo im Liegenden Lias und im Hängenden Malm vorkommen.

Der Malm ist am reichsten an Fossilien. Von den Makrofossilien seien nur *Cladocoropsis mirabilis* Felix (Fundorte 5, 13 und 31) und die Hydrozoen aus der Familie *Sphaeractinidae* (Fundorte 1, 2, 3 und 7) erwähnt.

Die Mikrofossilien wurden an mehreren Lokalitäten festgestellt. Es handelt sich um Kalkalgen und Foraminifiren, die sowohl den Untermalm (stellenweise vielleicht auch mit dem obersten Dogger) als auch den Obermalm beweisen. Die an verschiedenen Lokalitäten vorkommenden Gemeinschaften sind folgende:

*Macroporella sellii* Crescenti - Fundorte 15, 22 und 28, an den letzteren zusammen mit *Pfenderina trochoidea* Smout & Sugden.

*Kurnubia palastiniensis* Henson (stellenweise auch mit *K. wellingsi* (Henson), *Pfenderina salernitana* Sartori & Crescenti, u. a.) - Fundorte 16, 17, 18, 22, 27 (zusammen mit *Clypeina jurassica* Favre), 29 und 30.

*Clypeina jurassica* Favre (stellenweise zusammen mit den grossen *Tintinniden*) - Fundorte 8, 14, 19, 20, 21, 24-27 und 32.

Auf Grund neuer Dokumentation konnte man im untersuchten Gebiet den Jura genauer von der Unterkreide abtrennen, was im Gelände sehr schwierig ist, weil sie lithologisch sehr ähnlich sind.

Angenommen am 27. September 1965.

Geologisch-paläontologisches Institut,  
Universität Zagreb,  
Socijalističke revolucije 8  
Institut für geologische Untersuchungen,  
Zagreb, Kupska 9

# JURSKE NASLAGE U PODRUČJU KORANE I GLAVNA NALAZIŠTA FOSILA

JURASSISCHE SCHICHTEN IM GEBIETE DES KORANA - FLUSSES  
UND WICHTIGE FOSSILIENFUNDORTE

